

VÝKONY

• CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ:

- Děloha (hysterektomie), vejcovody a vaječníky
- Předstěra (vrstva tukové tkáně překrývající nitrobřišní orgány)
- Části tlustého a tenkého střeva a slepé střevo
- Slezina
- Žlučník / část jater
- Část močového měchýře nebo močovodu

- Lymfatické uzliny
- Vnitřní výstelka dutiny břišní (pobřišnice)
- Vývod střeva přes stomii
- **HIPEC** (hypertermická intraperitoneální chemoterapie)
- **CHEMOTERAPIE** / cílená léčba / udržovací léčba

CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE

- Krvácení
- Infekce - rána / plíce / pánev / moč
- Poranění močového měchýře / střeva / močovodů / nervů / cév
- Sekundární zákrok k řešení komplikace
- Netěsnost spojení střeva (anastomózy)
- Tvorba krevních sraženin (trombóza)
- Potíže s odchodem moči nebo stolice
- Oteklé nebo bolestivé nohy - lymfédém
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Lymfokéla (kolekce lymfatické tekutiny)
- Kýla v jizvě po operaci

BĚŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉČBY


- Krvácení / infekce
- Průjem / inkontinence / zácpa
- Únava a změny nálady
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Sexuální dysfunkce (např. vaginální suchost, bolesti při sexu)
- Vypadávání vlasů
- Abnormální spojení mezi střevem nebo močovým měchýřem a pochvou (pístěl)
- Neuropatie (porucha citlivosti - brnění, mravenčení nebo necitlivost rukou a nohou)

Karcinom vaječníků

ZDE NALEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PACIENTKY

STADIUM

STUPEŇ DIFERENCIACE




ENGAGE
EUROPEAN NETWORK
OF GYNAECOLOGICAL CANCER
ADVOCACY GROUPS

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
EUROPEAN SOCIETY
OF GYNAECOLOGICAL
ONCOLOGY

Toto není informovaný souhlas ani právní dokument. Návrh a ilustrace: Mark Wickham ©UCD-GOG
Anatomické struktury jsou znázorněny schematicky a nemusí přesně odpovídat skutečné velikosti, tvaru ani umístění.



VÝKONY

- Hysteroskopie + biopsie + hormonální nitroděložní tělísko (spirála)
- **CHEMOTERAPIE**
- **CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ:**
- Děloha (hysterektomie (otevřená / minimálně invazivní)
- Vaječnody a/nebo vaječníky
- Lymfatické uzliny (sentinelové / všechny)
- Předstěra (vrstva tukové tkáně překrývající nitrobršíšní orgány)
- Biopsie jakékoli podezřelé oblasti v břiše
- **RADIOTERAPIE** zevní a/nebo vnitřní (brachyterapie)

CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE

- Krvácení
- Infekce - rána / plíce / pánev / moč
- Poranění močového měchýře / střev / močovodů / nervů / cév
- Sekundární zákrok k řešení komplikace
- Tvorba krevních sraženin (trombóza)
- Potíže s odchodem moči nebo stolice
- Oteklé nebo bolestivé nohy - lymfedém
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Lymfokéla (kolekce lymfatické tekutiny)
- Kýla v jizvě po operaci

BĚŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉČBY


- Krvácení / infekce
- Zánět močového měchýře, střev nebo kůže
- Průjem / inkontinence / zácpa
- Únava a změny nálady
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Sexuální dysfunkce (např. vaginální suchost, bolesti při sexu)
- Vypadávání vlasů
- Oteklé nebo bolestivé nohy - lymfedém
- Abnormální spojení mezi střevem nebo močovým měchýřem a pochvou (píštěl)
- Neuropatie (porucha citlivosti - brnění, mravenčení nebo necitlivost rukou a nohou)

Karcinom dělohy

STADIUM _____

STUPEŇ DIFERENCIACE _____

ZDE NALEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PACIENTKY



Toto není informovaný souhlas ani právní dokument. Návrh a ilustrace: Mark Wickham ©UCD-GOG
Anatomické struktury jsou znázorněny schematicky a nemusí přesně odpovídat skutečné velikosti, tvaru ani umístění.

VÝKONY

• CHEMOTERAPIE

• CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ:

- Děložní hrdlo (trachelektomie / konizace - odstranění části čípku)
- Děloha (hysterektomie (otevřená / minimálně invazivní))
- Přemístění nebo odstranění vaječníků / vejcovodů
- Lymfatické uzliny (sentinelové / všechny)
- Zavedení stentů k ochraně močových
- Vývod střeva přes stomii
- **RADIOTERAPIE** zevní a/nebo vnitřní (brachyterapie)

CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE

- Krvácení
- Infekce - rána / plíce / pánev / moč
- Poranění močového měchýře / střeva / močových / nervů / cév
- Sekundární zákrok k řešení komplikace
- Tvorba krevních sraženin (trombóza)
- Potíže s odchodem moči nebo stolice
- Oteklé nebo bolestivé nohy - lymfedém
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Lymfokéla (kolekce lymfatické tekutiny)
- Kýla v jizvě po operaci

BĚŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉČBY


- Krvácení / infekce
- Zánět močového měchýře, střev nebo kůže
- Průjem / inkontinence / zácpa
- Únava a změny nálady
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Sexuální dysfunkce (např. vaginální suchost, bolesti při sexu)
- Vypadávání vlasů
- Oteklé nebo bolestivé nohy - lymfedém
- Abnormální spojení mezi střevem nebo močovým měchýřem a pochvou (píštěl)
- Neuropatie (porucha citlivosti - brnění, mravenčení nebo necitlivost rukou a nohou)

Karcinom děložního hrdla

ZDE NALEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PACIENTKY


STADIUM

STUPEŇ DIFERENCIACE



- Totální
- Radikální
- Konizace

Toto není informovaný souhlas ani právní dokument. Návrh a ilustrace: Mark Wickham ©UCD-GOG
Anatomické struktury jsou znázorněny schematicky a nemusí přesně odpovídat skutečné velikosti, tvaru ani umístění.



VÝKONY

- **CHEMOTERAPIE**
- **CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ:**
 - Pochva (částečné nebo úplné odstranění)
 - Lymfatické uzliny v tříslích a/nebo v pánvi
 - Rekonstrukční plastická operace
 - Vývod střeva přes stomii
- **RADIOTERAPIE** zevní a/nebo vnitřní (brachyterapie)

CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE

- Krvácení
- Infekce - rána / plíce / pánev / moč
- Poranění močového měchýře / střev / močodů / nervů / cév
- Sekundární zákrok k řešení komplikace
- Tvorba krevních sraženin (trombóza)
- Oteklé nebo bolestivé nohy - lymfedém
- Lymfocysta

BĚŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉČBY

- Krvácení / infekce
- Zánět močového měchýře, střev nebo kůže
- Průjem / inkontinence / zácpa
- Únava a změny nálady
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Sexuální dysfunkce (např. suchost pochvy, zúžení / zkrácení, bolesti při sexu)
- Vypadávání vlasů
- Oteklé nebo bolestivé nohy - lymfedém
- Abnormální spojení mezi střevem nebo močovým měchýřem a pochvou (píštěl)
- Neuropatie (porucha citlivosti - brnění, mravenčení nebo necitlivost rukou a nohou)



EUROPEAN NETWORK
OF GYNAECOLOGICAL CANCER
ADVOCACY GROUPS



EUROPEAN SOCIETY
OF GYNAECOLOGICAL
ONCOLOGY



Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group


Karcinom pochvy

STADIUM _____

STUPEŇ DIFERENCIACE _____

Toto není informovaný souhlas ani právní dokument. Návrh a ilustrace: Mark Wickham ©UCD-GOG
Anatomické struktury jsou znázorněny schematicky a nemusí přesně odpovídat skutečné velikosti, tvaru ani umístění.

ZDE NALEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PACIENTKY



VÝKONY

- **CHEMOTERAPIE**
- **CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ:**
 - Zevní genitál (částečné nebo úplné odstranění)
 - Lymfatické uzliny v tříselech a/nebo v pánvi
 - Rekonstrukční plastická operace
 - Vývod střeva přes stomii
- **RADIOTERAPIE** zevní a/nebo vnitřní (brachyterapie)

CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE

- Krvácení
- Infekce - rána / plíce / pánev / moč
- Poranění močového měchýře / střeva / močovodů / nervů / cév
- Sekundární zákrok k řešení komplikace
- Tvorba krevních sraženin (trombóza)
- Oteklé nebo bolestivé nohy - lymfedém
- Lymfocysta
- Ztráta kožního cití (necitlivost)
- Serom (nahromadění tekutiny v místě odebrané tkáně)

BĚŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY LÉČBY

- Krvácení / infekce
- Zánět močového měchýře, střev nebo kůže
- Průjem / inkontinence / zácpa
- Únava a změny nálady
- Příznaky menopauzy (např. návaly horka)
- Sexuální dysfunkce (např. suchost pochvy, zúžení / zkrácení, bolesti při sexu)
- Vypadávání vlasů
- Oteklé nebo bolestivé nohy - lymfedém
- Abnormální spojení mezi střevem nebo močovým měchýřem a pochvou (píštěl)
- Neuropatie (porucha citlivosti - brnění, mravenčení nebo necitlivost rukou a nohou)

Karcinom vulvy

STADIUM _____

STUPEŇ DIFERENCIACE _____

Toto není informovaný souhlas ani právní dokument. Návrh a ilustrace: Mark Wickham ©UCD-GOG
Anatomické struktury jsou znázorněny schematicky a nemusí přesně odpovídat skutečné velikosti, tvaru ani umístění.

ZDE NALEPTE IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK PACIENTKY

