

PROCEDURE

- **HIPEC** (Chemioterapia intraperitoneale ipertermica)
- **CHEMIOTERAPIA**
- **CHIRURGIA** - Asportazione di:
 - Utero (isterectomia), tube ed ovaie
 - Omento (grebbie di tessuto adiposo presente sugli organi intra-addominali)
 - Parti dell'intestino crasso o intestino tenue ed appendice
 - Milza
 - Colecisti / porzioni del fegato
 - Parte della vescica o tratto di uretere
- Linfonodi
- Membrana sierosa addominale interna (peritoneo)
- Derivazione dell'intestino attraverso stomia (sacchetto intestinale)

COMPLICANZE CHIRURGICHE

- Emorragia
- Infezione - della ferita/ polmonare/pelvica/delle vie urinarie
- Lesione di vescica / intestino / ureteri/ nervi/ vasi sanguigni
- Secondo intervento chirurgico per gestione delle complicanze
- Incontinenza fecale
- Trombosi venosa profonda/ Embolia polmonare
- Ritenzione di urina o di feci
- Arti inferiori gonfi o dolenti - linfedema
- Sintomi legati alla menopausa (es. vampate)
- Linfocele (accumulo di linfa)
- Ernia nella sede di incisione chirurgica

EFFETTI COLLATERALI COMUNI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO

- Emorragia / Infezione
- Diarrea/ incontinenza / costipazione
- Affaticamento e sbalzi d'umore
- Sintomi legati alla menopausa (es. vampate)
- Disfunzioni sessuali (es. secchezza vaginale, rapporti sessuali dolorosi)
- Perdita di capelli
- Collegamento anomalo tra l'intestino o vescica e la vagina (fistola)
- Neuropatia (intorpidimento di mani e piedi)



Carcinoma dell'ovaio

Il presente non costituisce un modulo di consenso o un documento legale. Design e illustrazione: Mark Wickham ©UCD-GOG
Le strutture anatomiche sono illustrate schematicamente e potrebbero non riflettere dimensioni, forma o posizione precise.

ADESIVO CON IL NUMERO DEL PAZIENTE QUI

STADIO

GRADO



ENGAGE
EUROPEAN NETWORK
OF GYNAECOLOGICAL CANCER
ADVOCACY GROUPS

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
EUROPEAN SOCIETY
OF GYNAECOLOGICAL
ONCOLOGY

PROCEDURE

- Isteroscopia + biopsia + posizionamento di dispositivo ormonale intrauterino (spirale)
- **CHEMIOTERAPIA**
- **CHIRURGIA** - Asportazione di:
 - Utero (isterectomia (laparotomica/ laparoscopica))
 - Tube e/o ovaie
 - Linfonodi (sentinella/ asportazione sistematica)
- Omento (grebbie di tessuto adiposo presente sugli organi intra-addominali)
- Biopsie su regioni addominali sospette
- Radioterapia esterna e/o interna (brachiterapia)

COMPLICANZE CHIRURGICHE

- Emorragia
- Infezione - della ferita/ polmonare/pelvica/delle vie urinarie
- Lesione di vescica / intestino / ureteri/ nervi/ vasi sanguigni
- Secondo intervento chirurgico per gestione delle complicanze
- Trombosi venosa profonda/ Embolia polmonare
- Ritenzione di urina o di feci
- Arti inferiori gonfi o dolenti - linfedema
- Sintomi legati alla menopausa (es. vampate)
- Linfocele (accumulo di linfa)
- Ernia nella sede di incisione chirurgica


EFFETTI COLLATERALI COMUNI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO

- Emorragia / Infezione
- Infiammazione della vescica, intestino o derma
- Diarrea/ incontinenza / costipazione
- Affaticamento e sbalzi d'umore
- Sintomi legati alla menopausa (es. vampate)
- Disfunzioni sessuali (es. secchezza vaginale, rapporti sessuali dolorosi)
- Perdita di capelli
- Arti inferiori gonfi o dolenti - linfedema
- Collegamento anomalo tra l'intestino o vescica e la vagina (fistola)
- Neuropatia (intorpidimento di mani e piedi)

Carcinoma uterino


STADIO

GRADO



Il presente non costituisce un modulo di consenso o un documento legale. Design e illustrazione: Mark Wickham ©UCD-GOG
Le strutture anatomiche sono illustrate schematicamente e potrebbero non riflettere dimensioni, forma o posizione precise.

ADESIVO CON IL NUMERO DEL PAZIENTE QUI



PROCEDURE

- **CHEMIOTERAPIA**
- **CHIRURGIA** - Asportazione di:
 - Cervice (conizzazione / trachelectomia)
 - Utero (isterectomia (laparotomica/ laparoscopica))
 - Sospensione o rimozione di ovaie / tube
 - Linfonodi (sentinella/asportazione sistematica)
 - Inserimento di stent per protezione degli ureteri
 - Derivazione dell'intestino attraverso stomia (sacchetto intestinale)
- **Radioterapia** esterna e/o interna (brachiterapia)

COMPLICANZE CHIRURGICHE

- Emorragia
- Infezione - della ferita/polmonare/pelvica/delle vie urinarie
- Lesione di vescica / intestino / ureteri/ nervi/ vasi sanguigni
- Secondo intervento chirurgico per gestione delle complicanze
- Trombosi venosa profonda/Embolia polmonare
- Ritenzione di urina o di feci
- Arti inferiori gonfi o dolenti - linfedema
- Sintomi legati alla menopausa (es. vampate)
- Linfocele (accumulo di linfa)
- Ernia nella sede di incisione chirurgica

EFFETTI COLLATERALI COMUNI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO


- Emorragia / Infezione
- Infiammazione della vescica, intestino o derma
- Diarrea/ incontinenza / costipazione
- Affaticamento e sbalzi d'umore
- Sintomi legati alla menopausa (es. vampate)
- Disfunzioni sessuali (es. secchezza vaginale, rapporti sessuali dolorosi)
- Perdita di capelli
- Arti inferiori gonfi o dolenti - linfedema
- Collegamento anomalo tra l'intestino o vescica e la vagina (fistola)
- Neuropatia (intorpidimento di mani e piedi)

Carcinoma della cervice uterina

ADESIVO CON IL NUMERO DEL PAZIENTE QUI


STAGE

GRADE



----- Totale
----- Radicale
----- Conizzazione

Il presente non costituisce un modulo di consenso o un documento legale. Design e illustrazione: Mark Wickham ©UCD-GOG
Le strutture anatomiche sono illustrate schematicamente e potrebbero non riflettere dimensioni, forma o posizione precise.



ENGAGE
EUROPEAN NETWORK
OF GYNAECOLOGICAL CANCER
ADVOCACY GROUPS

ISGO-PPI
Irish Society of Gynaecological Oncology
Public and Patient Involvement Group

ESGO
EUROPEAN SOCIETY
OF GYNAECOLOGICAL
ONCOLOGY

PROCEDURE

- **CHEMIOTERAPIA**
- **CHIRURGIA** - Asportazione di:
 - Vagina (parziale o totale)
 - Linfonodi inguinali e/o pelvici
 - Chirurgia plastica ricostruttiva
- Derivazione dell'intestino attraverso stomia (sacchetto intestinale)
- **Radioterapia** esterna e/o interna (brachiterapia)

COMPLICANZE CHIRURGICHE

- Emorragia
- Infezione - della ferita/polmonare/pelvica/delle vie urinarie
- Lesione di vescica / intestino / ureteri/ nervi/ vasi sanguigni
- Secondo intervento chirurgico per gestione delle complicanze
- Trombosi venosa profonda/Embolia polmonare
- Arti inferiori gonfi o dolenti - linfedema
- Linfocisti

EFFETTI COLLATERALI COMUNI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO

- Emorragia / Infezione
- Infiammazione della vescica, intestino o derma
- Diarrea/ incontinenza / costipazione
- Affaticamento e sbalzi d'umore
- Sintomi legati alla menopausa (es. vampate)
- Disfunzioni sessuali (es. secchezza vaginale, rapporti sessuali dolorosi)
- Perdita di capelli
- Arti inferiori gonfi o dolenti - linfedema
- Collegamento anomalo tra l'intestino o vescica e la vagina (fistola)
- Neuropatia (intorpidimento di mani e piedi)



Carcinoma della vagina

STADIO _____

GRADO _____

Il presente non costituisce un modulo di consenso o un documento legale. Design e illustrazione: Mark Wickham ©UCD-GOG
Le strutture anatomiche sono illustrate schematicamente e potrebbero non riflettere dimensioni, forma o posizione precise.

ADESIVO CON IL NUMERO DEL PAZIENTE QUI



PROCEDURE

• CHEMIOTERAPIA

• CHIRURGIA - Asportazione di:

- Vulva (parziale o totale)
- Linfonodi inguinali e/o pelvici
- Chirurgia plastica ricostruttiva
- Derivazione dell'intestino attraverso stomia (sacchetto intestinale)
- **Radioterapia** esterna e/o interna (brachiterapia)

COMPLICANZE CHIRURGICHE

- Emorragia
- Infezione - della ferita/polmonare/pelvica/delle vie urinarie
- Lesione di vescica / intestino / ureteri/ nervi/ vasi sanguigni
- Secondo intervento chirurgico per gestione delle complicanze
- Trombosi venosa profonda/Embolia polmonare
- Arti inferiori gonfi o dolenti - linfedema
- Linfocisti
- Perdita della sensibilità cutanea (intorpidimento)
- Sieroma (accumulo di liquidi nel punto in cui è stato asportato il tessuto)

EFFETTI COLLATERALI COMUNI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO

- Emorragia / Infezione
- Infiammazione della vescica, intestino o derma
- Diarrea/ incontinenza / costipazione
- Affaticamento e sbalzi d'umore
- Sintomi legati alla menopausa (es. vampate)
- Disfunzioni sessuali (es. secchezza vaginale, rapporti sessuali dolorosi)
- Perdita di capelli
- Arti inferiori gonfi o dolenti - linfedema
- Collegamento anomalo tra l'intestino o vescica e la vagina (fistola)
- Neuropatia (intorpidimento di mani e piedi)

Carcinoma vulvare

STADIO _____

GRADO _____

Il presente non costituisce un modulo di consenso o un documento legale. Design e illustrazione: Mark Wickham ©UCD-GOG
Le strutture anatomiche sono illustrate schematicamente e potrebbero non riflettere dimensioni, forma o posizione precise.

ADESIVO CON IL NUMERO DEL PAZIENTE QUI

